

Все товары
сертифицированы

Быстрая доставка заказов
бесплатно от 2 500 руб.

Более 50 000
доказанных клиентов!

Вет аптека и зоомагазин интернет

Zoo1.ru

Первоклассное качество

0

Ваша корзина пуста.

>
[Каталог](#)
>
[Вет аптека](#)
>
[От глистов и паразитов](#)
>
Пиростоп

Пиростоп

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

34 (Количество
голосов)



10 мл **450 руб.**

1

в корзину



20 мл **650 руб.**

1

в корзину

100 мл **1 599 руб.**

1

Описание

Пиро-Стоп флакон 10 мл — противопротозойный инъекционный препарат, содержащий в 1 мл раствора в качестве действующего вещества 120 мг имидакарба дипропионата, а также вспомогательные компоненты: 10 мг поливинилпирролидона, 9 мг бензилового спирта, 30 мг пропионовой кислоты и воду для инъекций.

Показания

Назначают крупному рогатому скоту, овцам, лошадям, ослам, мулам и собакам для лечения кровепаразитарных заболеваний (бабезиоза, тейлериоза, анаплазмоза, нуталлиоза, эрлихиоза и смешанных инвазий).

Дозы и способ применения

Пиро-Стоп вводят животным с соблюдением правил асептики и антисептики в область шеи, подкожно или внутримышечно в следующих дозах по показанию:

Крупному рогатому скоту:	
Лечение и профилактика бабезиоза	2 мл на 100 кг массы животного однократно
Лечение и профилактика анаплазмоза и смешанных инвазий	2,5 мл на 100 кг массы животного однократно
Устранение состояния носительства	4 мл на 100 кг массы животного, двукратно с интервалом 14 дней
Лошадям, ослам и мулам:	
Лечение и профилактика бабезиоза	2 мл на 100 кг массы животного однократно
Устранение состояния носительства <i>Babesia caballi</i>	2 мл на 100 кг массы животного, двукратно с интервалом 24 ч.
Устранение состояния носительства <i>Babesia equi</i>	4 мл на 100 кг массы животного, четырехкратно с интервалом 72 ч.
Овцам:	
Лечение бабезиоза, анаплазмоза и смешанных инвазий	0,2 мл на 10 кг массы животного однократно
Собакам:	
Лечение и профилактика пироплазмоза	0,25 – 0,5 мл на 10 кг массы животного однократно

С профилактической целью Пиро-Стоп применяют при выявлении у одного или двух животных в стаде клинических признаков заболевания, при нападении (или угрозе нападения) на животных иксодовых клещей — переносчиков кровепаразитарных заболеваний, а также в течение недели после

перемещения животных в неблагополучные по данным заболеваниям регионы. Крупному рогатому скоту препарат вводят 1 раз в 6 недель, лошадям, ослам, мулам — 1 раз в 4 недели, собакам — один раз в сезон при угрозе нападения на животных иксодовых клещей (охота, турпоход в лесном массиве и пр.). Собаки должны находиться под наблюдением ветеринарного врача не менее 15 минут после обработки. Одновременно с Пиро-Стопом собакам рекомендуется применение антигистаминных препаратов в соответствии с инструкциями по применению. Животным с клиническими признаками babesиоза до введения препарата целесообразно также применить антигистаминные препараты. В связи с возможной болевой реакцией препарат не следует вводить в одно место крупным животным в объеме, превышающем 10 мл, мелким животным в объеме, превышающем 2,5 мл. При массовой гибели кровепаразитов и разрушении эритроцитов после применения Пиро-Стопа у животных возможно развитие интоксикации. В этом случае необходимо проведение интенсивной терапии, включающей внутривенное введение растворов электролитов и гепатопротекторов. Перед массовой обработкой каждую серию препарата следует испытать на небольшой группе животных (5 – 10 голов). При отсутствии осложнений в течение 3 суток приступают к обработке всего поголовья.

Фармакологические свойства

Действующее вещество препарата относится к группе имидазолинов и проявляет высокую эффективность в отношении кровепаразитов: *Babesia bovis*, *Babesia ovis*, *Babesia bigemina*, *Babesia colchica*, *Babesia equi*, *Babesia divergens*, *Babesia canis*, *Babesia caballi*, *Babesia gibsoni*, *Francaiella colchica*, *Theileria annulata*, *Theileria sergenti*, *Theileria mutans*, *Theileria orientalis*, *Theileria ovis*, *Theileria recondita*, *Theileria tarandirangiferis*, *Nuttallia equi*, *Anaplasma marginale*, *Anaplasma ovis*, а также *Ehrlichia canis*. Механизм антипротозойного действия имидакарба связан с подавлением поступления инозитола (витаминоподобного вещества), необходимого для жизнедеятельности кровепаразита, а также с нарушением образования и использования кровепаразитами полиаминов. После парентерального введения препарата терапевтическая концентрация имидакарба дипропионата в крови достигается через 18 – 24 ч. и удерживается на пироплазмостатическом уровне в течение 4 – 6 недель. Накапливается имидакарб дипропионат в основном в почках и печени, выводится из организма преимущественно с мочой. Пиро-Стоп по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам и в рекомендованных дозах не обладает местнораздражающим, эмбриотоксическим и мутагенным действием.

Побочные действия

В редких случаях возможна местная реакция в виде гиперемии или болезненной припухлости на месте введения препарата, самопроизвольно исчезающие через 1 – 2 суток. При повышенной

индивидуальной чувствительности к препарату у животных возможны брадикардия, учащение и нарушение дыхания, анорексия, обильное слюно- и слезотечение, гипергидроз кожи, тремор мышц, частое мочеиспускание и дефекация. В этих случаях животному назначают подкожно 1 % раствор атропина сульфата, десенсибилизирующие лекарственные средства и симптоматическую терапию.

Противопоказания

Повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не допускается одновременное применение Пиро-Стопа с хлорорганическими, фосфорорганическими препаратами и другими ингибиторами холинэстеразы. Запрещается использовать препарат в течение 4 недель после вакцинации живой вакциной против бабезиоза или анаплазмоза.

Особые указания

Убой крупного рогатого скота, лошадей и овец на мясо разрешается не ранее, чем через 28 суток после последнего применения Пиро-Стопа. При вынужденном убое животных ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм пушным зверям. Молоко дойных коров и кобыл разрешается использовать для пищевых целей не ранее, чем через 4 суток после последнего введения Пиро-Стопа. Полученное ранее установленного срока молоко после кипячения может быть использовано в корм животным. Молоко дойных овец, обработанных Пиро-Стопом, запрещается использовать в пищевых целях в течение всего периода лактации. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо смыть проточной водой с мылом, при попадании внутрь — незамедлительно обратиться в медицинское учреждение, имея при себе инструкцию по применению Пиро-Стопа или флакон с этикеткой. Специфические антидоты отсутствуют.

Условия хранения

В темном, сухом и недоступном для животных и детей месте. Температура хранения от 2 до 25 °С. Срок годности в заводской упаковке — 2 года. Открытые флаконы хранить не более 28 дней.

Производитель

Апи-сан, Россия.

<http://zoo1.ru/vetapteka/ot-glistov-i-parazitov/pirostop>